Mode d'emploi du médicament PANSORAL

Dans quel cas le médicament PANSORAL est-il prescrit?

Ce gel buccal contient un antalgique (salicylate de choline) et un antiseptique (chlorure de cétalkonium).

Il est utilisé pour soulager les douleurs des aphtes et des inflammations de la bouche et des gencives.

Présentations du médicament PANSORAL

PANSORAL : gel pour application buccale ; tube de 15 g

Composition du médicament PANSORAL

p 100 g

Choline salicylate 8,6 g Cétalkonium chlorure 10 mg Alcool 39 g

Substances actives : Cétalkonium chlorure, Choline salicylate

Excipients : Badiane essence, Eau purifiée, Éthanol à 96 %, Glycérol, Méthylcellulose, Sodium

hydroxyde solution

Contre-indications du médicament PANSORAL

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie aux salicylés,
- enfant de moins de 6 ans.

Attention Ce médicament contient de l'alcool en quantité notable.

Fertilité, grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament PANSORAL

Déposer un pois de gel directement sur la gencive douloureuse ou sur la prothèse (en cas de prothèse provisoire). Une fois dans la bouche, le gel s'étale uniformément sous l'effet de la température et de la mastication.

Posologie usuelle:

• Adulte: 1 à 4 applications par jour.

.

Conseils

L'emploi de ce médicament ne doit pas remplacer le brossage soigneux et régulier des dents après chaque repas.

En cas d'irritation des gencives par une prothèse (dentier), n'hésitez pas à consulter rapidement votre dentiste.

Effets indésirables possibles du médicament PANSORAL

Picotements liés à l'alcool contenu dans le gel.

Réaction allergique.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.



Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.